



ФАРМАПРОСТ

Засіб профілактично-гігієнічний
Супозиторії з екстрактом простати,
оліями насіння гарбуза та амаранту

Склад. 1 супозиторій містить екстракт простати до 0,03 г (що містить 3,5 мг водорозчинних пептидів), олію насіння гарбуза 0,4 г, олію насіння амаранту 0,1 г. Допоміжні речовини: твердий жир.

Основна дія. Застосування супозиторіїв з оліями насіння гарбуза, амаранту та екстрактом простати сприяє зменшенню запалення та набряклості передміхурової залози, позитивно впливає на функціональну активність сперматозоїдів, ерекtilьну функцію і тонус м'язів сечового міхура, покращує процес сечовипускання.

Екстракт простати має комплекс біологічно активних пептидів які чинять регулюючу дію на процеси тканинного обміну, нормалізують секреторну функцію епітеліальних клітин, зменшують набряклість, поліпшують кровоток, нормалізують тонус м'язів сечового міхура, позитивно впливають на функціональну активність сперматозоїдів, покращують процес сечовипускання. Антиоксидантні властивості вітаміну Е, що міститься і в олії насіння гарбуза і в олії амаранту – гарантують збереження біологічної активності екстракту простати. Олія насіння гарбуза чинить протизапальну, ранозагоювальну, регенеруючу дію. Олія насіння амаранту сприяє насиченню органів і тканин киснем, за рахунок чого, значно покращує надходження пептидів до передміхурової залози.

Показання до застосування. Застосовується в якості ректального профілактично-гігієнічного засобу для профілактики різних запальних захворювань чоловічої статеві сфери, простатиті, гіперплазії (аденомі)

передміхурової залози, порушенні еректильної функції, для прискорення відновлення тканин і нормалізації функціонального стану після оперативного втручання на передміхуровій залозі.

Побічна дія. Препарат зазвичай добре переноситься, в поодиноких випадках можливі алергічні реакції.

Протипоказання. Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

Спосіб застосування та дози. Супозиторії застосовують ректально. Вводять якомога глибше, попередньо звільнивши від первинної упаковки. Призначають по 1 супозиторію 1-2 рази на добу протягом 5-10 днів. За необхідності курс застосування можна повторити.

Умови та термін зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці за температури не вище 25 °С. Термін придатності – 2 роки від дати виготовлення.

Не є лікарським засобом.

Упаковка: по 5 супозиторіїв в стрипі, по 2 стрипи в пачці.

Виробник. ПАТ «Монфарм» на замовлення ТОВ «ОЛІВІН ФАРМ».

Адреса потужностей виробництва.

Україна, 19100, Черкаська обл., м. Монастирище, вул. Заводська, 8.

Замовник: ТОВ «ОЛІВІН ФАРМ»,

Україна, 02125, м. Київ, пр-т Алішера Навої, буд. 69, оф. 107.

Офіційний дистриб'ютор: ТОВ «СІСТЕМ ФАРМ»

Україна, 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, 100/5,
тел. +38-097-073-00-48.

ТУ У 20.4-42265734-001:2018