

СЕРТИДАЗА ФОРТЕ



ІНСТРУКЦІЯ

для застосування дієтичної добавки

СЕРТИДАЗА ФОРТЕ гастро-резистентні таблетки (SERTIDASA FORTE 20 mg) gastro - resistant tablets)

Склад: одна таблетка містить:

активні інгредієнти: 20 мг серратіопептидази;

допоміжні речовини: лактози моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, крохмаль пшеничний, мальтодекстрин, тальк, магнію стеарат, сополімер метакрилової кислоти - етилакрилат (1:1) дисперсія 30%, триацетин, титану діоксид.; Без ГМО.

Рекомендації щодо застосування:

Фермент серратіопептидаза може бути рекомендована в раціонах дієтичного харчування як додаткове джерело протеолітичних ензимів - серратіопептидази, для створення оптимальних умов функціонування організму людини, в тому числі підвищення захисних сил, витривалості, сприяння відновленню після оперативних втручань та травм, профілактиці та зменшенню запалення, набряку та розщеплення сторонніх білків, зокрема фібрину. Серратіопептидазі властива фібринолітична, протизапальна та протинабрякова активність.

Серратіопептидаза добре проникає в місця запалення, лізує некротизовані тканини та продукти їх розпаду, зменшує гіперемію та прискорює проникнення й активність антибіотиків.

Серратіопептидаза може бути рекомендована лікарем при наступних станах:

- розтягненнях та болю у сухожиллях і м'язах;
- болю у спині та поперековій ділянці;
- суглобовому та ревматичному болю;
- хірургічні втручання, що супроводжуються запаленням, набряком та больовим синдромом;
- травмах опорно-рухового апарату як гострого так і хронічного перебігу;
- набрякові явища та процеси будь якої етіології
- гострі прояви запальних респіраторних станів
- патологічні стани статевих органів, що супроводжуються запаленням;
- патології органів малого тазу, запальних процесах у молочних залозах;
- гострі запальні зміни на шкірі та слизових;

Спосіб застосування та рекомендована добова доза:

Дорослим після 18 років по 1 таблетці на день, запиваючи водою, натщесерце за 30 хвилин до їди або через 2 години після їди протягом 10 днів. Таблетки слід ковтати, не розжовуючи, запиваючи достатньою кількістю рідини.

Не перевищуйте рекомендовану добову дозу!

Продукт не можна використовувати як заміну основного харчування!

Особливості щодо застосування: перед початком застосування та при одночасному застосуванні з будь-якими лікарськими засобами рекомендована консультація лікаря.

Застереження щодо застосування: слід з обережністю застосовувати хворим, які приймають антикоагулянти, мають порушення згортання крові та підвищені ризики кровотеч. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Протипоказання щодо застосування: підвищена чутливість до окремих компонентів дієтичної добавки. Дозволений до вживання з 18-ти років, не застосовувати дітям.

Не є лікарським засобом.

Форма випуску: таблетки, маса нетто 140 мг (по 30 таблеток в блістері).

Строк придатності: 3 роки.

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у сухому і недоступному для дітей місці.

Виробник: «ВЕТПРОМ» АД, м. Радомир, вул. «Отець Паїсій», №26, Болгарія, 2400,
тел.: +359 24519300

Виготовлено на замовлення ТОВ «СІСТЕМ ФАРМ»

Офіційний дистриб'ютор: ТОВ «СІСТЕМ ФАРМ», 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка 100/5, +38 097 073 00 48

Текст маркування розроблений оператором ринку, який несе повну відповідальність за відповідність продукції даним, наведеним на етикетці.

